

# COVID-19 Vaccine Moderna


## Entreposage et manipulation

### Conservation à l'état congelé

#### À conserver congelé entre -25° et -15°C

Ne pas conserver sur de la carboglace,  
ni à moins de -40°C

Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière.




### Décongeler chaque flacon avant utilisation

Représentations des flacons à titre d'illustration uniquement

#### 2 heures et 30 minutes au réfrigérateur


2° à 8°C



OU

#### 1 heure à température ambiante

15° à 25°C



Laisser le flacon à température ambiante pendant  
15 minutes avant administration

### Après décongélation

#### Flacon intact

Durées maximales

30  
jours

Réfrigérateur

2° à 8°C

12  
heures

Conservation au frais jusqu'à  
température ambiante

8° à 25°C



#### Une fois que la première dose a été prélevée

Durée maximale

6  
heures

Réfrigérateur ou  
température ambiante

Le flacon doit être conservé entre  
2° et 25°C. Noter la date et l'heure  
d'élimination sur l'étiquette  
du flacon.



Jeter le flacon après 6 heures d'utilisation.

Prélever chaque dose de 0,5 ml du flacon à l'aide de nouvelles aiguilles et seringues stériles pour  
chaque injection, afin de prévenir toute transmission d'agent infectieux d'une personne à une autre.

**La dose dans la seringue doit être utilisée immédiatement.**

**Une fois que le flacon a été percé pour prélever la première dose, le vaccin doit être  
utilisé immédiatement et jeté après 6 heures.**

Tout vaccin inutilisé ou déchet doit être éliminé conformément aux exigences locales.

**Ne JAMAIS recongeler un vaccin décongelé.**

moderna®

# COVID-19 Vaccine Moderna

## Posologie et administration

### Posologie et schéma d'administration

Le COVID-19 Vaccine Moderna est administré par voie intramusculaire sous la forme d'une série de **deux doses** (0,5 ml chacune).

**L'intervalle recommandé est de 28 jours.**

Il n'existe pas de données disponibles sur l'interchangeabilité du COVID-19 Vaccine Moderna avec d'autres vaccins contre la COVID-19 pour compléter la série de vaccination. Les personnes vaccinées ayant reçu une dose du COVID-19 Vaccine Moderna doivent recevoir une seconde dose du COVID-19 Vaccine Moderna pour que la série de vaccination soit complète.

### Administration

Tourner délicatement après la décongélation et avant chaque prélèvement. Le vaccin est prêt à l'emploi une fois décongelé. **Ne pas secouer, ni diluer.**

**Avant l'injection, vérifiez chaque dose afin de :**

Vérifier que le liquide est **blanc à blanc cassé**, à la fois dans le flacon et dans la seringue.

Vérifier que le volume dans la seringue est de **0,5 ml**

COVID-19 Vaccine Moderna peut contenir des particules blanches ou translucides inhérentes au produit.

Si la dose n'est pas correcte, ou en présence d'une coloration anormale ou d'autres particules, ne pas administrer le vaccin.



Remettez une carte de vaccination à la personne vaccinée ou à son soignant avec la date à laquelle la personne vaccinée doit revenir pour recevoir la **SECONDE DOSE** de COVID-19 Vaccine Moderna.

**Si vous avez des questions, veuillez vous rendre sur [www.modernacovid19global.com](https://www.modernacovid19global.com) et sélectionner votre pays.**

### INDICATIONS

Le COVID-19 Vaccine Moderna est indiqué pour une immunisation active visant prévenir la COVID-19, causée par le virus SARS-CoV-2 chez les personnes âgées de 18 ans et plus.

### CONTRE-INDICATION

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la section 6.1

moderna®